

Vorgehen First View - COVID-19

Eigenschutz! Bedenken Sie stets Ihre persönliche Schutzausrüstung: Mund-Nasen-Schutz & Handschuhe!
 Jeder Patient erhält von Beginn an einen Mund-Nasen-Schutz!

Ersteindruck Leitsymptom?
 Hinweise auf Atemwegsinfektion ggf. gastrointestinale Symptome?
 Kontakt zu bestätigten Covid-19 Patienten?
 Temperatur <35,0°C oder >37,5°C?
Ein Hinweis ausreichend.

V.a. COVID-19

Triage mit ESI Emergency Severity Index
 Kategorisierung nach ESI & Early Warning Score

Arztkontakt	SOFORT	< 15 Min	< 30 Min	< 60 Min	< 90 Min
	Schockraum Alarm Tel. 70 70	Sofortbehandlung durch First-View Arzt	Blutentnahme nach Profil, Einleitung der Erstdiagnostik, Befundung EKG bei med. Patienten, Initialtherapie (Analgesie, Infusion, o.ä.). Weiterleitung an nachfolgende Fachdisziplin ZNA.		

FFP2 Maske, Handschuhe, Flüssigkeitsdichter Kittel.
Patient in Isolation!

ENDE First View

WEITERFÜHRENDES Management

Therapie und Diagnostik nach Leitsymptom Diagnostik & Therapieeskalation je nach Befund und führender Fachdisziplin. Zuweisung in die jeweilige Fachklinik erfolgt durch First View Arzt.

LABOR
 Initial: Diff-BB, CRP, PCT, TSH, LDH, K, Na, Krea, CK, CK-MB, Quick.
Abstrich SRAS-CoV2 & Influenza
Art. BGA
Rö-Thorax

Entscheidungsbaum COVID-19 Verdacht/Nachweis

1 Punkt pro Parameter	1. Atemfrequenz $\geq 22/\text{min}$ 2. verändertes Bewusstsein (Glasgow Coma Score < 15) 3. systolischer Blutdruck $\leq 100 \text{ mmHg}$ 4. fehlende Oxygenierbarkeit mit nasaler O_2 Gabe bis 4L/Min $\text{SaO}_2 < 90\%$ bei pulmonaler Komorbidität $\text{SaO}_2 < 92\%$ bei Lungengesunden
	3 – 4 Punkte IMC/ICU 1 - 2 Punkte Stationär 0 Punkte Ambulant

Bei stat. Aufnahme - Early Warning Score
 - Pflegekennzeichen

COVID-19
 ⇒ Häusliche Isolation
 ⇒ Info an Gesundh.-amt
 ⇒ Info an Hausarzt
 ⇒ Symptomat. Therapie
 Alternative Therapie (CAP)
 ⇒ Leitliniengerecht n. Standard